
CARVYKTI® Batch/Lot No.:

Date of CARVYKTI® Infusion:

Hospital and Associated Clinics Name:

After Hours Phone Number:

Office Phone Number:

Name of CARVYKTI® Treating Oncologist:

This Patient has received CARVYKTI®.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION YOU SHOULD KNOW: CARVYKTI®
therapy can cause cytokine release syndrome (CRS) or neurological toxicities, which may be fatal or life-threatening. CRS may involve multiple organ systems. If your patient reports any signs or symptoms as referenced on this card, please contact the patient's oncologist immediately for further information.

FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS

CARVYKTI®

TARJETA DE BOLSILLO DEL PACIENTE

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento. **MUESTRE ESTA TARJETA** a cualquier profesional de atención médica que participe en su atención y si acude a la sala de emergencias.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA
PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON
CARVYKTI®**



08/24 cp-340694v3

Johnson & Johnson



PARA EL PACIENTE

Llame a su profesional de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si reconoce alguno de estos síntomas:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Debilidad en las piernas y los brazos con parálisis• Fiebre (100.4 °F o 38 °C o más)• Escalofríos o temblores• Dificultad para respirar• Latidos cardíacos rápidos o irregulares• Presión arterial muy baja• Mareos o aturdimiento• Dolor muscular o articular• Confusión o desorientación• Dificultad para hablar, leer o escribir• Cambios en el equilibrio o la coordinación• Dificultad para mover los músculos de la cara y los ojos• Entumecimiento facial | <ul style="list-style-type: none">• Hormigueo, entumecimiento y dolor de manos y pies• Movimientos más lentos• Arrastrar los pies o dar pequeños pasos al caminar• Cambios en la personalidad (p. ej., menos conversador, desinterés en las actividades)• Sonreír, fruncir el ceño o mostrar menos emociones• Dificultad para realizar tareas simples (p. ej., vestirse, alimentarse)• Pérdida de la memoria o embotamiento• Escritura a mano más pequeña• Temblores |
|--|--|

Siempre debe preguntarle a su médico sobre el uso de otros medicamentos mientras recibe CARVYKTI®.

Es importante recordar lo siguiente: Permanezca cerca del lugar donde recibió la infusión de CARVYKTI® durante al menos 4 semanas.

Si tiene **alguno** de estos síntomas, llame a su médico o busque atención médica de emergencia de inmediato. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CARVYKTI®. Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca.